

## تغذية الأفراس خلال المراحل الإنتاجية المختلفة وخلال فترة الراحة :

| العلف المالى<br>اليومي كجم | العلف المركز<br>اليومي كجم | كمية الغذاء<br>اليومي كجم | الوزن<br>كجم | العمر<br>بالسنة | الحالة                      |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 2.4-2.1                    | 5.6-4.9                    | 8 - 7                     | 500-450      | 2 - 1.5         | غير حامل ( خالية)           |
| 8 - 7                      | 2 - 1                      | 10 - 8                    | 500-450      | أكثر من سنتين   | حامل (فترة نصف الحمل الأول) |
| 4.5-3.6                    | 5.5-4.4                    | 10 - 8                    | 500-450      | سنتين           | (فترة نصف الحمل الثاني)     |
| 7.2-6.0                    | 4.8-4.0                    | 12 - 10                   | 550-500      | أكثر من سنتين   | فترة الرضاعة                |
| 5.0-4.5                    | 3.0-2.5                    | 8 - 7                     | 500          | سنتين           | فحل أثناء الراحة            |
| 5.1-4.8                    | 3.4-3.2                    | 8.5 - 8                   | 500          | سنتين           | فحل أثناء موسم التلقيح      |